

FEXALAR D®

Fexofenadina + Fenilefrina

COMPOSICIÓN:

Cada tableta recubierta contiene:

Fexofenadina HCl.....	60 mg
Fenilefrina HCl.....	25 mg
Excipientes, c.s.	

INDICACIONES:

Alivio de los síntomas asociados a procesos congestivos del tracto respiratorio superior como rinitis alérgica, con estornudos, rinorrea, congestión nasal, comezón en nariz, paladar y garganta, así como ojos irritados con lagrimeo. Administrar en adultos y niños mayores de 12 años cuando se deseen al mismo tiempo las propiedades antihistamínicas de la fexofenadina y las descongestivas nasales de la fenilefrina.

DOSIS:

Adultos y niños mayores de 12 años: una tableta dos veces al día (cada 12 horas), antes de los alimentos.

Pacientes con insuficiencia renal: se recomienda una tableta al día como dosis inicial. Las tabletas deben tragarse enteras y evitar su administración junto con los alimentos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

 Oral.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Hipersensibilidad o idiosincrasia a agentes adrenérgicos o a otros fármacos de estructuras químicas semejantes. Hipertensión arterial o arteriopatía coronaria severa. Administración junto con fenilpropanolamina. Pacientes en tratamiento con inhibidores de la monoaminoxidasa (MAO) o durante los catorce días posteriores a la discontinuación del tratamiento con ese fármaco. Pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, retención de orina, hipertiroidismo. Niños menores de 12 años. Embarazo y lactancia.

PRECAUCIONES:

Usar con precaución en pacientes con diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, glaucoma, hipertiroidismo, hipertrofia prostática, insuficiencia renal e hiperreactividad a la efedrina.

EFFECTOS ADVERSOS:

Dolor de cabeza, somnolencia, mareos, náuseas. Hipertensión arterial, ocasionalmente arritmias cardíacas y bradicardia refleja. Psicosis, nerviosismo, excitabilidad, insomnio, midriasis, dolor ocular.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Es aconsejable dejar un intervalo de 2 horas entre la administración de fexofenadina y de antiácidos que contengan hidróxido de aluminio y magnesio. La eritromicina o ketoconazol aumenta 2-3 veces el nivel plasmático de la fexofenadina. El uso de fenilefrina junto con fármacos antihipertensivos que interfieran con la actividad simpática como la metildopa, la mecamilamina y la reserpina puede reducir el efecto antihipertensivo de los mismos. La fenilefrina con aminas simpaticomiméticas puede tener efecto cardiovascular adicional; ya que se puede producir estimulación del sistema nervioso central provocando convulsiones o colapso cardiovascular acompañado de hipotensión particularmente en personas de edad avanzada.

ADVERTENCIA:

No administrar a personas alérgicas a la tartrazina.

Venta bajo prescripción médica.

Producto medicinal, mantener fuera del alcance de los niños.

Almacenar en lugar fresco y seco (no mayor a 30°C).

Medpharma®